



Scheda per la valutazione del rischio di tromboembolismo venoso in **CHIR. OTORINOLARINGOIATRICA**

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita ___/___/___ cc _____

FATTORI DI RISCHIO TEV

➤ **RELATIVI ALL'INTERVENTO**

BASSI = 1 PUNTO per ogni item selezionato.....
(Si considerano in linea di massima come chirurgia minore tutti gli interventi di durata <45 min.)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Posizionamento drenaggi trans-timpanici | <input type="checkbox"/> Rinossatoturbinoplastica |
| <input type="checkbox"/> Chirurgia laringea in micro laringoscopia | <input type="checkbox"/> Cordectomia ed altri interv.su laringe con laser CO2 |
| <input type="checkbox"/> Uvulopalatofaringoplastica | <input type="checkbox"/> Atresia auris |
| <input type="checkbox"/> Riduzione fratture ossa del naso | <input type="checkbox"/> Exeresi cisti del collo |
| <input type="checkbox"/> Otoplastica | <input type="checkbox"/> Impianto cocleare e protesi impiantabili |
| <input type="checkbox"/> Tracheotomia | <input type="checkbox"/> Plastica del frenulo |
| <input type="checkbox"/> Adenotonsillectomia | <input type="checkbox"/> Paracentesi timpanica |
| <input type="checkbox"/> Otosclerosi | <input type="checkbox"/> Exeresi di ghiandola sottomandibolare |
| <input type="checkbox"/> Interventi su seni paranasali | <input type="checkbox"/> Timpanoplastica |
| <input type="checkbox"/> Miringoplastica | <input type="checkbox"/> Tiroidectomia |
| <input type="checkbox"/> Parotidectomia | <input type="checkbox"/> Altro |

ELEVATI = 2 PUNTI per ogni item selezionato.....
Tutte le tipologie non incluse nel precedente elenco

➤ **RELATIVI AL PAZIENTE**

DEBOLI = 1 PUNTO per ogni item selezionato.....

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Età 41-60 anni | <input type="checkbox"/> Patologia respiratoria acuta |
| <input type="checkbox"/> Edema arti inferiori | <input type="checkbox"/> COPD |
| <input type="checkbox"/> Vene varicose | <input type="checkbox"/> Infarto miocardico acuto |
| <input type="checkbox"/> Obesità (BMI >25) | <input type="checkbox"/> Scompenso cardiaco congestizio (<30 giorni) |
| <input type="checkbox"/> Uso di estrogeni/terapia orm. sost. | <input type="checkbox"/> Immobilità a letto |
| <input type="checkbox"/> Gravidanza e puerperio | <input type="checkbox"/> Anamnesi positiva per malattia inf. intestinale |
| <input type="checkbox"/> Pregressa chirurgia maggiore (<30 giorni) | <input type="checkbox"/> Sepsis (<30 giorni) |
| <input type="checkbox"/> Malattia infiammatoria cronica | <input type="checkbox"/> Storia familiare di TEV |
| <input type="checkbox"/> Sindrome nefrosica | <input type="checkbox"/> Anamnesi di patologia riproduttiva (es.: abortività ricorrente, MEF, basso peso alla nascita, ecc.) |

MODERATI = 2 PUNTI per ogni item selezionato.....

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Età 61-74 anni | <input type="checkbox"/> Presenza di catetere venoso centrale |
| <input type="checkbox"/> Neoplasia (in atto o pregressa) | <input type="checkbox"/> Ingessatura arti inferiori |
| <input type="checkbox"/> Prolungata immobilità (≥3 giorni) | |

ELEVATI = 3 PUNTI per ogni item selezionato.....

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Età ≥75 anni | <input type="checkbox"/> Diatesi trombofilica (deficit di proteina C o S o AT III, resistenza alla proteina C attivata/fattore V Leiden, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Pregressa TVP o fenomeno trombo embolico | |



Scheda per la valutazione del rischio di tromboembolismo venoso in **CHIR. OTORINOLARINGOIATRICA**

ELEVATISSIMI = 5 PUNTI per ogni item selezionato.....

- Ictus (<30 giorni) Trauma maggiore con fratture di: col. vertebrale, pelvi, arti inf.
- Lesione midollare (<30 giorni)

VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO DI TEV **TOTALE**

Data __ / __ / ____ **FIRMA DEL MEDICO** _____

STRATEGIE PREVENTIVE CONSIGLIATE

<u>Valutazione</u>	<u>Classe di rischio</u>	<u>Incidenza TEV</u>	<u>Azione</u>
0-1	basso	2%	mobilizzazione precoce
2	moderato	10-20%	calze antitrombo o terapia farmacologica (durata di norma 7 giorni)
3 - 4	alto	20-40%	terapia farmacologica (durata 7 giorni o più da valutare se immobilità prolungata e/o complicanze)
≥5	elevato	40-80%	terapia farmacologica (minimo per 7 giorni, da valutare in caso di immobilità prolungata e/o complicanze). Considerare di prolungare la profilassi per almeno 7 giorni in caso di patologie gravi

FATTORI DI RISCHIO EMORRAGICI per i quali non si pratica la profilassi

- Emorragia in atto
- Diatesi emorragica congenita (es. Mal. Di Von Willebrand, emofilia)
- Diatesi emorragica acquisita (es. insuff. epatica acuta)
- Uso di anticoagulanti (es. warfarin con INR >2)
- Puntura lombare/anestesia spinale o epidurale previste entro 12 ore
- Puntura lombare/anestesia spinale o epidurale eseguite nelle 4 ore precedenti
- Piastrinopenia (<75 x 10⁹/l)
- Ipertensione sistolica non controllata (230/120 mmHg o più)

Altro _____

Data __ / __ / ____ **FIRMA DEL MEDICO** _____